



## Acer palmatum 'Atropurpureum'



|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur</b>            | 8 à 10 m                                                                    |
| <b>Largeur</b>            | 8-10m                                                                       |
| <b>Couronne</b>           | obovoïde à flabelliforme élancée, Couronne fermée et dense, grilig groeiend |
| <b>Écorce et branches</b> | lisses, gris-brun                                                           |
| <b>Couleur d'automne</b>  | Rouge                                                                       |
| <b>Fleurs</b>             | corymbes rouges, mai                                                        |
| <b>Fruits</b>             | monospermes, ailés, toujours par paires, rouge pâle                         |
| <b>Épines</b>             | Aucun                                                                       |
| <b>Toxicité</b>           | non toxique (habituellement)                                                |
| <b>Type de sol</b>        | tous, sauf les sols argileux, et trop secs                                  |
| <b>Pavage</b>             | Ne supporte pas de revêtement                                               |
| <b>Rusticité</b>          | 6 (-23,3 à -17,8 °C)                                                        |
| <b>Rusticité</b>          | 6 (-23,3 à -17,8 °C)                                                        |
| <b>Autre résistances</b>  | supporte le gel (Rusticité 1 à 6)                                           |
| <b>Application</b>        | bacs pour arbres, plantation sur dalle, petits jardins, patios              |
| <b>Form</b>               | arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc                               |
| <b>Provenance</b>         | Constant Watz, Woudenberg, Pays-Bas, ± 1910                                 |

Petit arbuste robuste qui devient un petit arbre à la couronne obovoïde à flabellée élancée. Les branches retombent gracieusement surtout chez les arbres plus matures. Les cinq à sept lobes de la feuille palmatipartite sont soudés sur un tiers à un quart de la base foliaire. Les contours du limbe sont finement dentés. La feuille, lie-de-vin foncé, est légèrement plus rouge en bourgeonnant. À l'automne, elle prend une teinte rouge vif. 'Atropurpureum' ayant également été semé par le passé, il existe désormais plusieurs clones difficiles à distinguer en détail les uns des autres. Chez les clones inférieurs, la feuille devient vert-pourpre l'été. 'Atropurpureum' fait partie des cultivars les plus répandus de l'Acer palmatum.