



## Acer rubrum 'Bowhall'



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Hauteur</b>             | 12-15 m  |
| <b>Largeur</b>             | 5-8m   |
| <b>Couronne</b>            | en pyramide élancé, Couronne fermée et dense       |
| <b>Écorce et branches</b>  | gris   |
| <b>Couleur d'automne</b>   | Orange, Rouge                                      |
| <b>Fleurs</b>              | rouge, fleurs en mars                              |
| <b>Fruits</b>              | rouge, discret                                     |
| <b>Épines</b>              | Aucun  |
| <b>Toxicité</b>            | non toxique (habituellement)                       |
| <b>Type de sol</b>         | sol limoneux, sol sableux, sol acide               |
| <b>Pavage</b>              | Supporte le revêtement/pavage partiel              |
| <b>Rusticité</b>           | 4 (-34,4 à -28,9 °C)                               |
| <b>Rusticité</b>           | 4 (-34,4 à -28,9 °C)                               |
| <b>Autre résistances</b>   | supporte le gel (Rusticité 1 à 6)                  |
| <b>Arbre pour la faune</b> | supporte le gel (Rusticité 1 à 6), arbre mellifère |
| <b>Application</b>         | avenues et rues larges, rues étroites              |
| <b>Form</b>                | arbre en simple tige/tronc                         |

Sélection américaine un peu plus ancienne pouvant atteindre jusqu'à 15 m de haut environ. La couronne de cet arbre est de forme pyramidale élancée, ce qui en fait un arbre d'alignement idéal pour les avenues. Ses jeunes rameaux ainsi que le pétiole de ses feuilles se distinguent par leur couleur rouge brunâtre. Ses grandes feuilles palmées d'environ 1 cm sont, quant à elles, d'un vert lumineux, tandis que le revers est glauque. En automne, son feuillage se parent d'un dégradé de rouge orangé. Ses fleurs rouges apparaissent avant la feuillaison. Cet arbre développe une racine principale importante comportant un réseau dense de radicelles. Si cet arbre est planté en sol calcaire et sec, sa croissance stagne et la coloration automnale de son feuillage ne se produit pas. Cette essence supporte difficilement le vent (marin). Le cultivar 'Bowhall' présente de nombreuses similitudes avec l'*A. freemanii* 'Armstrong', à la différence que sa taille est un peu moins élevée et qu'il possède une couronne plus fermée. De plus, sa coloration automnale est plus intense. Zone de rusticité: 4.