




Laburnum anagyroides



Hauteur	5 - 7 (9) m
Largeur	4-5m
Couronne	évasée élancée, Couronne semi-ouverte, grillig groeiend
Écorce et branches	vert brunâtre, jeunes rameaux verts
Fleurs	jaune, fleurs en avril, fleurs odorantes
Fruits	gousses mesurant jusqu'à 8 cm de long, graines noires
Épines	Aucun
Toxicité	avec des composants toxiques
Type de sol	supporte les sols calcaires
Pavage	Ne supporte pas de revêtement
Rusticité	5b (-26,0 à -23,4 °C)
Rusticité	5b (-26,0 à -23,4 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, Résiste au sel d'épandage
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, Résiste au sel d'épandage, arbre à papillon
Application	zones industrielles, petits jardins, patios
Form	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
Provenance	Europe centrale et méridionale

Buisson érigé pouvant croître en un arbre multicaule. Souvent, lors de la culture, on opte pour des spécimens qui développeront plusieurs troncs, le but étant d'augmenter l'effet de la floraison. Les jeunes rameaux sont remarquablement verts. À un âge plus avancé, les branches et le tronc sont vert brunâtre. Le tronc reste lisse. Les feuilles vert foncé sont composées de trois folioles qui mesurent, chacune, 3 - 8 cm de long et sont glauques sur le revers. La floraison abondante est constituée de grappes pendantes, jaune d'or, de 1 - 2 (25) cm de long. Toutefois, les fleurs sont inodores. Les gousses, les feuilles et les jeunes rameaux sont recouverts d'une pubescence soyeuse. Il s'agit de la caractéristique essentielle qui distingue le Cytise Aubour d'autres espèces. Le L. anagyroides est souvent utilisé comme porte-greffe. Comme arbre ornemental, il vaut mieux choisir le Laburnum watereri 'Vossii', un hybride issu du croisement entre le L. alpinum et le L. anagyroides.