



## Liquidambar styraciflua 'Andrew Hewson'



<b>Hauteur</b>	15-20 m
<b>Largeur</b>	8-12m
<b>Couronne</b>	en pyramide étalé, Couronne semi-ouverte
<b>Écorce et branches</b>	cannelé, gris
<b>Feuilles</b>	feuillaison tardive
<b>Couleur d'automne</b>	Jaune, Orange, Rouge, Violet
<b>Fleurs</b>	vert, fleurs en avril
<b>Fruits</b>	brun
<b>Épines</b>	Aucun
<b>Toxicité</b>	non toxique (habituellement)
<b>Type de sol</b>	sol argileux, sol limoneux, sol sableux, sol tourbeux, sol acide
<b>Humidité du sol</b>	Possible sur sol humide
<b>Pavage</b>	Supporte le revêtement/pavage
<b>Rusticité</b>	5b (-26,0 à -23,4 °C)
<b>Rusticité</b>	5b (-26,0 à -23,4 °C)
<b>Autre résistances</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6)
<b>Application</b>	avenues et rues larges
<b>Form</b>	arbre en simple tige/tronc

Présente de nombreuses ressemblances avec l'espèce, bien que ses feuilles soient plus grandes et plus profondément découpées. De plus, ce cultivar, qui mesure entre 15 et 2 m de haut, reste de plus petite taille que l'espèce. Sa couronne est pyramidale élancée, tandis que son tronc droit s'élève jusqu'à la cime. Par la suite, ses branches, qui s'inclineront légèrement, formeront une large couronne pyramidale. Les branches plus anciennes sont recouvertes d'épaisses lames subéreuses de couleur grise. Ses feuilles, qui comptent 5 à 7 lobes, se parent de teintes spectaculaires en automne: lie-de-vin, avec du jaune, de l'orange et du violet. Lorsque cet arbre est planté dans un endroit humide, son feuillage devient plus violacé. La floraison discrète est suivie de l'apparition de capsules d'environ 2,5 cm. Elles restent sur l'arbre jusqu'à une date avancée de l'hiver. Zone de rusticité: 5b