



## Quercus robur 'Timuki'



|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur            | 15 à 20 m                                                                       |
| Largeur            | 8-12m                                                                           |
| Couronne           | ronde, Couronne semi-ouverte                                                    |
| Écorce et branches | rameaux marron foncé, écorce gris foncé, profondément cannelée                  |
| Fleurs             | chatons ?jaune vert, 2 à 4 cm, mai                                              |
| Fruits             | ovoïdes à ovales, 1,5 à 2,5 cm, par 2 à 6, cupule à écailles trigones contiguës |
| Épines             | Aucun                                                                           |
| Toxicité           | non toxique (habituellement)                                                    |
| Type de sol        | riche en nutriments et retenant l'humidité                                      |
| Humidité du sol    | Possible sur sol humide                                                         |
| Pavage             | Ne supporte pas de revêtement                                                   |
| Rusticité          | 5a (-28,8 à -26,1 °C)                                                           |
| Rusticité          | 5a (-28,8 à -26,1 °C)                                                           |
| Autre résistances  | supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, Résiste au sel d'épandage        |
| Application        | zones industrielles                                                             |
| Form               | arbre en simple tige/tronc                                                      |
| Provenance         | Raimond Cinovskis, Riga, Lettonie, 1946                                         |

Cultivar à feuilles rouges du Q. robur à couronne ovoïde étalée et finalement arrondie. Il pousse nettement mieux que l'ancien cultivar 'Purpurascens' à feuilles pourpres. L'écorce, la floraison et les fruits sont semblables à l'espèce. Les feuilles obovoïdes sont de forme identique à celles de l'espèce, mais plus grandes que chez le 'Purpurascens'. La feuille, verte à sa sortie, fonce de plus en plus pour prendre une teinte pourpre vert foncé brillant en passant par le rouge à la fin de l'été. L'arbre a été découvert en 1939 par M. Timuki, mais n'a été baptisé et reproduit qu'en 1946. Sa belle croissance, et les belles couleurs de son feuillage sont les principales caractéristiques de ce chêne au feuillage pourpre. De plus, le 'Timuki' est nettement moins sensible au mildiou.