



## Sorbus discolor



<b>Hauteur</b>	6 - 8 m
<b>Largeur</b>	3-5m
<b>Couronne</b>	ovoïde étalée, Couronne semi-ouverte
<b>Écorce et branches</b>	grise, rameaux glabres de couleur brun rouge brillant
<b>Feuilles</b>	feuillaison précoce
<b>Couleur d'automne</b>	Rouge
<b>Fleurs</b>	blanc, fleurs en mai
<b>Fruits</b>	blanc cassé à crème, tournant vers le rose, Ø 0,7 - 1 cm
<b>Épines</b>	Aucun
<b>Toxicité</b>	non toxique (habituellement)
<b>Type de sol</b>	peu exigeant, s'accommode d'un sol pauvre et sec
<b>Humidité du sol</b>	Possible sur sol sec
<b>Pavage</b>	Supporte le revêtement/pavage
<b>Rusticité</b>	5 (-28,8 à -23,4 °C)
<b>Rusticité</b>	5 (-28,8 à -23,4 °C)
<b>Autre résistances</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
<b>Arbre pour la faune</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre nourrissant pour oiseau
<b>Form</b>	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
<b>Provenance</b>	Chine Septentrionale
<b>Synonymes</b>	<i>Sorbus pekinensis discolor</i>

Ce petit arbre a une couronne ouverte avec de robustes branches ascendantes. Comme il n'a pas de branche axiale, la couronne prend une forme ovoïde étalée. Les jeunes rameaux sont glabres et de couleur brun rouge brillant. La feuille imparipennée est composée de 11 - 17 folioles de forme lancéolée à oblongue et les feuillettes sont persistantes. Le contour de limbe est denté, sauf à la base du limbe où le contour est régulier. Le S. discolor a une feuille verte foncé au dessous vert bleuâtre. À la venue de l'automne, les feuilles deviennent rouge foncé. La floraison se fait en ombelles individuelles ramifiées légèrement pubescentes, composées de nombreuses fleurs blanches. Les fruits apparaissent en fin d'été. Ils sont de couleur blanc cassé à crème avec parfois un reflet rose clair. Les fruits de couleurs claires contrastent avec les couleurs automnales de l'arbre. Un arbre très conseillé.