



Acer palmatum 'Inaba-shidare'



| | |
|----------------------------|--|
| Hauteur | 2 - 3 m |
| Largeur | 2-3m |
| Couronne | étalée, port pleureur, Couronne semi-ouverte, grillig groeiend |
| Écorce et branches | brunes à gris brun, lisses |
| Couleur d'automne | Orange, Rouge |
| Fleurs | rouge violacé, fleurs en avril |
| Fruits | noix ailées (samars) |
| Épines | Aucun |
| Toxicité | non toxique (habituellement) |
| Type de sol | sol sableux, humique, bien drainé |
| Pavage | Ne supporte pas de revêtement |
| Rusticité | 6 (-23,3 à -17,8 °C) |
| Rusticité | 6 (-23,3 à -17,8 °C) |
| Autre résistances | supporte le gel (Rusticité 1 à 6) |
| Arbre pour la faune | supporte le gel (Rusticité 1 à 6), arbre mellifère |
| Application | bacs pour arbres, plantation sur dalle, petits jardins, patios |
| Form | arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc |
| Provenance | Yokohama Nursery Company, Japon, 1930 |

Buisson à croissance lente, se caractérisant par une croissance irrégulière et évasée, et n'atteignant que rarement la taille d'un petit arbre multicaule. Sa couronne est plus large que haute, et il n'est pas rare qu'elle atteigne une largeur d'environ 4 m. Les spécimens les plus vieux présentent un branchage légèrement pleureur. Les feuilles sont palmatifides à palmatiséquées, et leurs lobes sont profondément découpés. Elles possèdent entre cinq et sept (parfois neuf) lobes acuminés. Le feuillage est lie-de-vin foncé, teinte qu'il conservera tout au long de l'été. À la venue de l'automne, le feuillage arbore des couleurs allant du rouge profond ou rouge orangé. Si cette essence est plantée dans un emplacement sec, ces couleurs perdront de leur intensité. Le cultivar 'Inaba-shidare' est l'un des plus beaux cultivars de la grande famille aux formes variées des érables du Japon. Cette variété présente de nombreuses similitudes avec le cultivar 'Garnet'. Toutefois, lorsque le 'Garnet' devient plus vieux, son branchage a tendance à être plus tombant. Préfère la mi-ombre.