



Acer rubrum 'Brandywine'



Hauteur	8 à 10 m
Largeur	7-9m
Couronne	ovoïde élancée à ovoïde étalée, Couronne fermée et dense
Écorce et branches	tronc gris, rameaux rouge brun foncé
Couleur d'automne	Rouge, Violet
Fleurs	rouges, en petites ombelles, mars/avril
Fruits	aucun ; cultivar mâle, cultivar stérile
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	humide, non calcaire
Pavage	Supporte le revêtement/pavage partiel
Rusticité	4 (-34,4 à -28,9 °C)
Rusticité	4 (-34,4 à -28,9 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6)
Application	avenues et rues larges
Form	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
Provenance	U.S. National Arboretum, Washington, DC, USA, 1994

Arbre de taille moyenne à couronne ovoïde régulière, retombant légèrement avec l'âge pour prendre des formes ovoïdes étalées. L'arbre a été sélectionné lors d'une étude sur la transmission héréditaire des couleurs automnales, et la résistance aux cicadelles. Le 'Brandywine' se pare de superbes couleurs automnales. En deux semaines environ, la feuille prend d'abord une teinte rouge qui se transforme ensuite en pourpre. De petite dimension, le 'Brandywine' est tout à fait adapté comme arbre d'alignement, ou dans des espaces plus restreints. De plus, cet arbre étant mâle, il n'y aura aucun ensemencement. Sa croissance sera entravée sur un sol calcaire. Sur un tel sol, ainsi que sur un sol très sec, les décolorations seront moins prononcées à l'automne. Supporte mal le vent (de mer).