



## Acer saccharinum 'Asplenifolium'



<b>Hauteur</b>	20 m
<b>Largeur</b>	14-16m
<b>Couronne</b>	ronde à flabelliforme, Couronne semi-ouverte
<b>Écorce et branches</b>	grises et lisses
<b>Couleur d'automne</b>	Jaune
<b>Fleurs</b>	jaune-vert, discrètes, mars
<b>Fruits</b>	samare, 4 à 5 cm de long
<b>Épines</b>	Aucun
<b>Toxicité</b>	non toxique (habituellement)
<b>Type de sol</b>	secs comme humides, supporte le pavage
<b>Humidité du sol</b>	Résistant à de courtes inondations, Résistant à de longues inondations
<b>Pavage</b>	Supporte le revêtement/pavage partiel
<b>Rusticité</b>	4 (-34,4 à -28,9 °C)
<b>Rusticité</b>	4 (-34,4 à -28,9 °C)
<b>Autre résistances</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6)
<b>Arbre pour la faune</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), arbre mellifère
<b>Application</b>	avenues et rues larges, zones industrielles
<b>Form</b>	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
<b>Provenance</b>	De Bie van Aalst, Zundert, Pays-Bas, 1925

Grand arbre à couronne étalée de forme en éventail à ovoïde. Ses branches dressées et aérées s'étalent largement. Arbre d'environ 20 m de haut et de large. Les jeunes feuilles sont couleur bronze. En été, ses feuilles à 5 lobes profondément découpées deviennent d'un vert lumineux sur la face supérieure et blanc gris sur la face inférieure. Elles atteignent entre 8 et 14 cm de long. Les lobes des feuilles sont un peu moins écartés et sont moins profondément découpés que ceux du cultivar 'Laciniatum Wieri'. En automne, son feuillage vire au jaune. Ses fleurs apparaissent avant la feuillaison. Ses racines sont superficielles et fortement ramifiées, avec de nombreuses racines secondaires. Il se peut que ses racines principales soulèvent le revêtement et le pavage. Cette essence supporte les sols humides. Souvent utilisée en alignement dans les rues, on préfère aujourd'hui la planter dans les parcs en raison de ses branches cassantes par temps venteux. Zone de rusticité: 4.