




Aesculus pavia var. discolor



Hauteur	environ 10 m
Largeur	6-8m
Couronne	arrondie, Couronne fermée et dense
Écorce et branches	brunes, les rameaux présentent parfois une pubescence courte
Fleurs	carotte, fleurs en juin
Fruits	lisses, brun clair, production irrégulière de fruits
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	peu d'exigences sur la nature du sol
Pavage	Ne supporte pas de revêtement
Rusticité	6b (-20,5 à -17,8 °C)
Rusticité	6b (-20,5 à -17,8 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6)
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), arbre mellifère
Form	arbre en simple tige/tronc
Provenance	sud-est de l'Amérique du Nord

Ce cultivar est légèrement plus grand que ceux de l'espèce, mais reste toutefois nettement plus petit que l'A. pavia 'Atrosanguinea'. Il se développe en un grand buisson, voire en un arbre de taille moyenne possédant une couronne arrondie bien fermée. Ses rameaux duveteux développent des bourgeons non visqueux. Le revers de ses feuilles à pétiole court se distingue par le duvet tomenteux qui les recouvre. La face supérieure est satinée et de couleur vert foncé. Ses feuilles palmées, qui atteignent jusqu'à 15 cm de diamètre, sont constituées de 5 folioles. L'effeuillage a lieu précocement en automne. Ses fleurs jaune rougeâtre sont disposées en panicules dressées pouvant atteindre jusqu'à 2 cm de long. Cet arbre a une préférence marquée pour les sols légèrement humides. Il est sensible au sel de salage et résiste bien au froid. Il ne supporte ni le revêtement, ni le pavage.