




## Quercus xturneri 'Pseudoturneri'



|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur</b>            | 8 - 10 (15) m                                           |
| <b>Largeur</b>            | 8-10m                                                   |
| <b>Couronne</b>           | conique étalée à arrondie , Couronne semi-ouverte       |
| <b>Écorce et branches</b> | brun gris, cannelées, jeunes rameaux jaune pâle         |
| <b>Fleurs</b>             | blanc gris, fleurs en mai                               |
| <b>Fruits</b>             | petits glands ovoïdes, 2 - 2,5 cm, groupés par 3 - 7    |
| <b>Épines</b>             | Aucun                                                   |
| <b>Toxicité</b>           | non toxique (habituellement)                            |
| <b>Type de sol</b>        | riche en nutriments, argileux, de préférence humide     |
| <b>Pavage</b>             | Ne supporte pas de revêtement                           |
| <b>Rusticité</b>          | 7b (-14,9 à -12,3 °C)                                   |
| <b>Rusticité</b>          | 7b (-14,9 à -12,3 °C)                                   |
| <b>Autre résistances</b>  | Résiste au sel d'épandage                               |
| <b>Form</b>               | arbre en simple tige/tronc, baliveau, arbre multi-tronc |
| <b>Provenance</b>         | Angleterre, ± 1880                                      |

Quercus turneri est un arbre au feuillage semi-caduc, issu d'un croisement entre Q. ilex et Q. robur. Le cultivar 'Pseudoturneri' est un arbre sempervirent dont le développement va de la forme buissonnière à celle d'un arbre multicaule haut de 8 - 10 m. Son port est dressé puis s'étale largement par la suite. Les jeunes rameaux sont jaune pâle et recouverts d'une pubescence feutrée. Les feuilles sont coriaces et mesurent 5 - 13 cm de long et 2,5 - 4 cm de large. Elles présentent 4 à 8 paires de lobes peu profonds ou des dents. La face supérieure est vert foncé, la face inférieure est grise couverte d'une pubescence feutrée. Lorsque l'hiver se termine, le nouveau feuillage apparaît et les feuilles sempervirentes tombent. La floraison remarquable contraste joliment avec le feuillage vert foncé brillant. Un tiers à la moitié des glands au long pétiole sont entourés d'une cupule.