





Sorbus discolor



Hauteur	6 - 8 m
Largeur	3-5m
Couronne	ovoïde étalée, Couronne semi-ouverte
Écorce et branches	grise, rameaux glabres de couleur brun rouge brillant
Feuilles	feuillaison précoce
Couleur d'automne	Rouge
Fleurs	blanc, fleurs en mai
Fruits	blanc cassé à crème, tournant vers le rose, Ø 0,7 - 1 cm
Épines	Aucun
Toxicité	non toxique (habituellement)
Type de sol	peu exigeant, s'accommode d'un sol pauvre et sec
Humidité du sol	Possible sur sol sec
Pavage	Supporte le revêtement/pavage
Rusticité	5 (-28,8 à -23,4 °C)
Rusticité	5 (-28,8 à -23,4 °C)
Autre résistances	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
Arbre pour la faune	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre nourrissant pour oiseau
Form	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
Provenance	Chine Septentrionale
Synonymes	Sorbus pekinensis discolor

Ce petit arbre a une couronne ouverte avec de robustes branches ascendantes. Comme il n'a pas de branche axiale, la couronne prend une forme ovoïde étalée. Les jeunes rameaux sont glabres et de couleur brun rouge brillant. La feuille imparipennée est composée de 11 - 17 folioles de forme lancéolée à oblongue et les feuilletes sont persistantes. Le contour de limbe est denté, sauf à la base du limbe où le contour est régulier. Le S. discolor a une feuille vert foncé au dessous vert bleuâtre. À la venue de l'automne, les feuilles deviennent rouge foncé. La floraison se fait en ombelles individuelles ramifiées légèrement pubescentes, composées de nombreuses fleurs blanches. Les fruits apparaissent en fin d'été. Ils sont de couleur blanc cassé à crème avec parfois un reflet rose clair. Les fruits de couleurs claires contrastent avec les couleurs automnales de l'arbre. Un arbre très conseillé.