



Tilia x europaea 'Wratislaviensis'



| | |
|----------------------------|---|
| Hauteur | 30 - 40 m |
| Largeur | 10-15m |
| Couronne | pyramidale étalée, Couronne semi-ouverte |
| Écorce et branches | grises, cannelées, rameaux glabres, verts, ensuite bruns |
| Fleurs | jaune, fleurs en juin |
| Fruits | orbiculaires à ovales, Ø 0,6 cm, brun grisâtre, tomenteux |
| Épines | Aucun |
| Toxicité | non toxique (habituellement) |
| Type de sol | tous |
| Pavage | Supporte le revêtement/pavage |
| Rusticité | 4 (-34,4 à -28,9 °C) |
| Rusticité | 4 (-34,4 à -28,9 °C) |
| Autre résistances | supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne |
| Arbre pour la faune | supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre à papillon |
| Application | avenues et rues larges |
| Form | arbre en simple tige/tronc |
| Provenance | Gemeentekwekerij Breslau, Allemagne, 1898 |
| Synonymes | Tilia x vulgaris 'Wratislaviensis' |

Ancien cultivar qui devient un arbre de grande taille et qui possède une large couronne pyramidale. Son tronc noir donne souvent naissance à quelques très grosses branches charpentières, sur lesquelles poussent des branches latérales inclinées, irrégulières. L'écorce reste longtemps mince. Des cannelures profondes n'apparaissent qu'à un stade ultérieur. Les jeunes feuilles sont d'un jaune lumineux remarquable et virent ensuite au vert. Cet arbre est moins impressionnant en été en raison de son feuillage de couleur claire. En automne, les feuilles deviennent jaune orangé à jaunes. Les grandes feuilles sont légèrement acuminées sur le sommet et dentées sur le contour. Des fleurs blanc jaunâtre, disposées en corymbes pendants par petits groupes de 3 à 11, apparaissent au début de l'été. Le 'Wratislaviensis' est sensible aux attaques des pucerons ainsi qu'au miellat et à la fumagine qui s'ensuivent.