



## Tilia americana 'Redmond'



<b>Hauteur</b>	12 - 20 m
<b>Largeur</b>	8-12m
<b>Couronne</b>	conique (élancée), Couronne semi-ouverte
<b>Écorce et branches</b>	grises et peu profondément cannelées, jeunes rameaux vert olive
<b>Fleurs</b>	chamois, fleurs en juillet, fleurs odorantes
<b>Fruits</b>	orbiculaires à elliptiques, grisâtres, légèrement tomenteux, Ø ± 0,9 cm
<b>Épines</b>	Aucun
<b>Toxicité</b>	non toxique (habituellement)
<b>Type de sol</b>	peu d'exigences, sol pas trop sec
<b>Pavage</b>	Supporte le revêtement/pavage
<b>Rusticité</b>	5b (-26,0 à -23,4 °C)
<b>Rusticité</b>	5b (-26,0 à -23,4 °C)
<b>Autre résistances</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
<b>Arbre pour la faune</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre à papillon
<b>Application</b>	avenues et rues larges, zones industrielles
<b>Form</b>	arbre en simple tige/tronc
<b>Provenance</b>	Plumfield Nurseries, Fremont, Nebraska, 1942

Arbre à croissance moyennement rapide mesurant 12 - 20 m de haut sur environ 6 - 7 m de large. La couronne s'élargit par la suite. Il se distingue par son tronc rectiligne. L'écorce grise est lisse dans un premier temps, mais devient peu profondément cannelée par la suite. Les jeunes rameaux sont vert olive, sauf sur la face exposée au soleil et sur la cime, où ils sont souvent brun rougeâtre. Les feuilles sont étonnamment grandes, très acuminées sur le sommet et d'un vert plus clair que celui de l'espèce. La base du limbe est cordiforme oblique et le contour grossièrement denté. Des fleurs jaune pâle odorantes apparaissent à partir de juillet. Chaque fleur mesure 1,2 cm de diamètre environ. Le cultivar 'Redmond' se distingue essentiellement de l'espèce par le fait qu'il supporte le revêtement et le pavage et qu'il ne craint pas ou peu les pucerons. Grâce à son port élancé, il convient bien en alignement dans les rues.