



## Tilia cordata 'Winter Orange'



<b>Hauteur</b>	8 à 10 m
<b>Largeur</b>	5-6m
<b>Couronne</b>	ovoïde étalée à arrondie, Couronne semi-ouverte
<b>Écorce et branches</b>	rameaux rouge orangé remarquables en hiver surtout, écorce brun foncé, cannelée
<b>Fleurs</b>	en corymbes par 5 à 9, blanc crème, fin juin/début juillet, fleurs odorantes
<b>Fruits</b>	ronds à ovoïdes, Ø env. 0,6 cm, gris légèrement feutré
<b>Épines</b>	Aucun
<b>Toxicité</b>	non toxique (habituellement)
<b>Type de sol</b>	tous, supporte la sécheresse
<b>Humidité du sol</b>	Possible sur sol sec
<b>Pavage</b>	Supporte le revêtement/pavage
<b>Rusticité</b>	4 (-34,4 à -28,9 °C)
<b>Rusticité</b>	4 (-34,4 à -28,9 °C)
<b>Autre résistances</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne
<b>Arbre pour la faune</b>	supporte le gel (Rusticité 1 à 6), très bonne, arbre à papillon
<b>Application</b>	avenues et rues larges, zones côtières
<b>Form</b>	arbre en simple tige/tronc, arbre multi-tronc
<b>Provenance</b>	J. Lombarts, Zundert, Pays-Bas, 1988

Arbre remarquable de taille moyenne, restant nettement plus petit que l'espèce, de 8 à 1 m de hauteur. Sa couronne ramifiée assez dense est ovoïde étalée à arrondie. Les rameaux d'un ou deux ans sont d'un remarquable rouge orangé. Ils se remarquent surtout l'hiver. L'écorce âgée est identique à celle de l'espèce ; marron foncé et cannelée. La feuille est plus ou moins arrondie avec une base cordiforme et un apex aigu. Elle est vert foncé mat l'été et se décolore en beurre-frais avant de tomber. Vers la fin juin, des fleurs blanc crème très parfumées éclosent en courts corymbes. Ils sont suivis de fruits ronds à ovoïdes, légèrement feutrés. Ce semis a été découvert en 1977 à l'état sauvage en forêt et introduit onze ans plus tard. Ce sont principalement ses rameaux colorés qui lui confèrent sa valeur ornementale.